



ВЕТЕРИНАРНЫЕ КЛИНИКИ «Доктор Вет»
РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО!
г. Минск, Подшипниковый проезд, 9; ул. Скрипникова, 39

ВЕТЕРИНАРНЫЕ КАБИНЕТЫ «Доктор Вет»
г. Минск, ул. Матусевича 72; ул. Сурганова 76; Логойский тракт 1А

Телефоны колл-центра: (017) 388-28-28; А1 и МТС: 7031

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости №
000147118 от 11.12.2021

Кличка: Шлепа; **вид животного:** собаки; **пол:** самка; **порода:** беспородная; **возраст:** 2 года.

Владелец: Жилинов Илья Юрьевич; **адрес:** Рокоссовского 91-76; **телефон:** +375 (29) 126-72-52; **e-mail:** ilia-zilinov@yandex.by.

Результат исследования:

ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ

Умеренно наполненный. Стенка около 2,8 мм, двухконтурная, гипозоженная. Содержимое анэхогенное, в полости эхогенный осадок в значительном количестве. Визуализируемые фрагменты желчных протоков не дилатированы.

ПЕЧЕНЬ

Расположение типичное. Размер уменьшен. Контуры ровные, четкие. Края острые. Паренхима неоднородная, зернистая, гипозоженная. Внутривенечные желчные протоки не расширены.

ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА

Размер увеличен (правая доля около 17 мм). Контуры неровные. Паренхима неоднородная, смешанной эхогенности, с затеками свободной жидкости.

СЕЛЕЗЁНКА

Топография не изменена, размеры не увеличены. Контуры ровные. Паренхима неоднородная, гетерогенная

ПОЧКА ЛЕВАЯ

Размеры около 44x27 мм. Контуры ровные. Визуализируемые фрагменты капсулы без особенностей. Рисунок интравенальных структур хорошо дифференцирован во всех отделах. Лоханка, мочеточник не дилатированы. В паренхиме и лоханке кальцинаты до 2,1 мм

ПОЧКА ПРАВАЯ

Размеры около 48x27 мм. Контуры ровные. Визуализируемые фрагменты капсулы без особенностей. Рисунок интравенальных структур хорошо дифференцирован во всех отделах. Лоханка, мочеточник не дилатированы. В паренхиме кальцинаты до 2 мм

МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ

Визуализация удовлетворительная. Пузырь в типичном месте. Контуры не изменены на всех визуализируемых участках. Стенка пузыря не утолщена, дифференциация слоёв сохранена. Содержимое анэхогенное, неомогенное, в полости эхогенная взвесь, эхогенное включение около 5 мм. Объем около 37 мл

ЖКТ

Стенка желудка около 3 мм, дифференциация слоёв сохранена, соотношение слоёв не изменено, складчатость слабо выражена, в полости жидкость в значительном количестве

Стенки кишечника не утолщены, дифференциация слоёв сохранена, соотношение слоёв не изменено, просвет не дилатирован, перистальтика снижена

Умеренное скопление газов, каловых масс в полости толстого кишечника.

Ткани брыжейки повышенной эхогенности. Свободная жидкость в небольшом количестве

Заключение:

Холецистит (острый? отек? анафилаксия?). Микрогепатия, гепатопатия. Панкреопатия (панкреатит?, отек?). Спленопатия. Нефропатия. Асцит. Перитонит?. Признаки гастрита, гипотония ЖКТ. Включение в полости мочевого пузыря.