



г. [REDACTED] ул. [REDACTED] 1
(метро
+7 (495) [REDACTED] +7 ([REDACTED]) [REDACTED])

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ЛЕЧЕНИЮ №000022947 от 23.05.2026

Пациент: Таша, Британская короткошерстная
[REDACTED] а22@ [REDACTED] ru: г. [REDACTED] ул. [REDACTED] 3,
кв. [REDACTED] +7([REDACTED]) [REDACTED]

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ САМКИ

Наличие свободной жидкости в брюшной полости: не визуализируется.
Лимфатические узлы брюшной полости: без особенностей.

Мочевой пузырь: визуализируется. Расположение типичное. Форма овоидная. Размер: умеренно наполнен. Содержимое: однородное, анэхогенное. Стенка не утолщена, 1,3 мм. Новообразования не визуализируются.

Уретра: проксимальный отдел уретры не расширен, стенки не утолщены.

Почки:

Левая почка: визуализируется. Не увеличена, 29,9 x 19,2 мм. Форма овальная. Контуры не ровные. Расположение типичное. Капсула дифференцируется. КМД сохранена. Соотношение коркового и мозгового слоев: нормальное. Корковый слой однородный, эхогенность не изменена. Мозговой слой однородный, эхогенность не изменена. Лоханка не изменена. Конкременты не визуализируются. Мочеточник не визуализируется, не расширен. Сосудистый рисунок (ЦДК) выражен умеренно. Новообразования не визуализируются.

Правая почка: визуализируется. Не увеличена, 37 x 17 мм. Форма овальная. Контуры ровные. Расположение типичное. Капсула не дифференцируется. КМД сохранена. Соотношение коркового и мозгового слоев: изменено в сторону кортикального слоя. Корковый слой однородный, эхогенность не изменена. Мозговой слой однородный, эхогенность не изменена. Лоханка не изменена. Конкременты не визуализируются. Мочеточник не визуализируется, не расширен. Сосудистый рисунок (ЦДК) выражен умеренно. Новообразования не визуализируются.

Надпочечники:

Левый надпочечник: визуализируется. Размер 2.6 мм. Форма типичная. Контуры ровные. Границы четкие. Эхогенность не изменена. Эхоструктура однородная. КМД сохранена. Новообразования не визуализируются.

Правый надпочечник: визуализируется. Размер 2.8 мм. Форма типичная. Контуры ровные. Границы четкие. Эхогенность не изменена. Эхоструктура однородная. КМД сохранена. Новообразования не визуализируются.

Матка: не визуализируется. ОГЭ

Яичники: не визуализируются. ОГЭ

Селезенка: визуализируется. Размер: не увеличена. Контуры ровные. Эхоструктура не однородная за счет множества гипоехогенных, аваскулярных узелков, не правильной формы. Эхогенность изменена, повышена. Сосудистый рисунок выражен умеренно. Новообразования не визуализируются.

Печень: визуализируется. Расположение: типичное. Размер: не увеличена. Контуры ровные, четкие. Свободный край острый. Эхоструктура паренхимы однородная. Эхогенность изменена. Сосудистый рисунок печени выражен умеренно. Новообразования не выявлены.

Желчный пузырь: визуализируется. Умеренно наполнен. Контуры ровные. Форма пузыря типичная. Содержимое не однородное, в просвете визуализируется умеренное количество гипоехогенного осадка. Стенка не утолщена, 1 мм, но значительно гиперэхогенна. Общий желчный проток не расширен.

Поджелудочная железа: визуализируется. Не увеличена. Левая доля 8,2 мм. Тело 6,6 мм. Правая доля 9,3 мм. Эхогенность не изменена. Эхоструктура однородная. Проток диффузно расширен до

доля 9,5мм. Эхогенность не изменена. Эхоструктура однородная. проток диффузно расширен до 3,1мм. Новообразования не визуализируются. Жировая ткань в области поджелудочной железы не изменена. В хвосте левой доли визуализируется очаговое кистоподобное образование, диаметром 7,5мм, аваскулярное, с анэхогенным содержимым с большим клеточным составом. Капсула слабо выражена.

Желудочно-кишечный тракт:

Желудок: перистальтика сохранена. Толщина стенки 2,5мм. Дифференциация слоев стенки сохранена. Соотношение слоев стенки желудка изменено, утолщен подслизистый слой. Содержимое: умеренное количество жидкостного гипоэхогенного содержимого. Проходимость пилоруса сохранена.

12-перстная кишка: перистальтика сохранена. Толщина стенки 2,3мм. Дифференциация слоев стенки сохранена. Соотношение слоев стенки кишки не изменено. Просвет не расширен.

Тощая кишка: перистальтика сохранена. Толщина стенки 2,1мм. Дифференциация слоев стенки сохранена. Соотношение слоев стенки кишки не изменено. Просвет не расширен.

Подвздошная кишка: перистальтика сохранена. Толщина стенки 4мм. Дифференциация слоев стенки сохранена. Соотношение слоев стенки кишки изменено, утолщен мышечный слой. Просвет не расширен. Локально повышена эхогенность регионарной жировой ткани.

Ободочная кишка: перистальтика не визуализируется. Толщина стенки 1мм.

Дифференциация слоев стенки сохранена. Соотношение слоев стенки кишки не изменено. Просвет расширен однородным гиперэхогенным содержимым.

Ультразвуковые особенности других органов: без особенностей.

Заключение: на момент исследования УЗ-признаки:

- Диффузных слабовыраженных изменений паренхимы печени; Хронического холецистита с образованием гипозоногенного осадка в просвете;
- Билатеральных диффузных гериатрических изменений паренхимы почек;
- Диффузного изменения паренхимы поджелудочной железы, хараткерной для очагового фиброза; Дилатации протока ПЖЖ, что не исключает наличие вирсунгита;
- Образования псевдокисты в хвосте левой доли поджелудочной железы (вариант гериатрической нормы)
- Гастрита, вероятнее всего хронического с признаками нарушения эвакуаторной функции желудка; Илеита, вероятнее всего хронического; Локального повышения эхогенности регионарной жировой ткани (вариант хронического илеита, а так же вариант нормы для кошек)

Данное заключение не является диагнозом и должно быть клинически интерпретировано лечащим врачом.

Ветеринарный врач:

Врач:

/подпись/

Хозяин:

/подпись/

Дата печати: 03.08.2026 13:59

**ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ОТБЛАГОДАРИТЬ ВРАЧА, ОСТАВЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА
ОТЗЫВ!**

