

Выписка из медицинской карты животного
Дата: 15.05.2024 15:44

Описание лечения:

ОБЗОРНОЕ УЗИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ПРОТОКОЛ

ЖЕЛУДОК степень наполнения пустой. Перистальтика в норме. Стенка утолщена до 0.23 см в области фундуса (норма) и до 0.31 см в области тела (утолщена за счет мышечного слоя). Дифференциация слоев сохранена. Складки выражены. Окружающая жировая ткань локально повышенной эхогенности.

ПЕЧЕНЬ незначительно увеличена. Контуры ровные. Границы четкие. Край печени притуплен. Капсула дифференцируется. Эхогенность паренхимы относительно серповидной связки незначительно повышена. Эхоструктура не однородная, грубозернистая. Сосудистый рисунок выражен. Объемные образования в паренхиме не лоцируются расширены.

СЕЛЕЗЕНКА расположение типичное. Толщина 1.32 см. Контуры ровные. Границы четкие. Капсула дифференцируется. Эхогенность норма. Эхоструктура однородная. Край притуплен. Сосуды в области ворот не расширены. Объемные образования не лоцируются.

ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ форма грушевидная. Степень наполнения переполнен. Содержимое анэхогенно. Стенки пузыря не утолщены, толщина 0.06 см. Пузырный проток визуализируется до 0.3 см (верхняя граница нормы) Холедох не визуализируется.

ДПК не спазмирована. Перистальтика в норме продуктивная. Стенка не утолщена до 0.22 см. Дифференциация слоев сохранена. Просвет сомкнут.

ТОЩАЯ КИШКА не спазмирована. Перистальтика в норме продуктивная. Стенка не утолщена до 0.2 см. Дифференциация слоев сохранена. Просвет сомкнут, локально газ.

ПОДВЗДОШНАЯ КИШКА стенка не утолщена до 0.26 см. Дифференциация слоев сохранена.

ОБОДОЧНАЯ КИШКА перистальтика не визуализируется. Стенка не утолщена до 0.14 см. Содержимое плотное.

ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА визуализируется плохо. Эхогенность понижена. Эхоструктура однородная. Контуры ровные. Панкреатический проток не расширен. ПДПЖ 0.66 см, ЛДПЖ 0.95 см. Окружающий мезентериальный жир изоэхогенен.

ЛЕВАЯ ПОЧКА расположение типичное. Форма округлая. Размер 4.37 см на 2.65 см.

Контуров не ровные.

Капсула дифференцируется . КМД четкая . Эхогенность коркового слоя незначительно повышена .

Толщина коркового слоя 0.4 см. Лоханка не расширена.

ПРАВАЯ ПОЧКА расположение типичное. Форма округлая. Размер 4.28 см на 2.58см. Контуров не ровные.

Капсула дифференцируется .

КМД четкая . Эхогенность коркового слоя незначительно повышена .

Толщина коркового слоя 0.39 см. Лоханка не расширена .

МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ степень наполнения слабо наполнен(объем около 13 мл).Стенка не утолщена.

Дорсальная стенка до 0.10 см. Вентральная стенка до 0.11 см. Дифференциация слоев выражена .

Содержимое анэхогенное взвесь нет . Конкременты не визуализируются.Проксимальная часть уретры не расширена.

ЛИМФОУЗЛЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ медиальные подвздошные не визуализируются, не увеличены.

Тощекишечные лимфоузлы не увеличены.

Свободная жидкость в брюшной полости на момент исследования не лоцируется в следовом значительном количестве.

Свободный газ в брюшной полости на момент исследования не лоцируется.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на момент исследования наблюдается ЭХО признаки гастропатии (гастрит / иное), панкреатита , вероятно подострый ,нефропатии (нефрит /норма), переполнения желчного пузыря , спленомегалии, гепатопатии (гепатоз/стеатоз)

Рекомендации и назначения: