

### Диагноз

**Новообразование молочной железы 3\ 4 левый молочный пакеты, реакция левого пахового лимфоузла, реакция правого подмышечного лимфоузла, новообразование подкожной жировой клетчатки - кистоподобное, справа от корня хвоста** Предварительный от 16.11.2020 - **На лечении**  
Лечащий врач: Сеница Павел Александрович

### Консультация

#### Рекомендации:

- 1) обработка линии швов : протирать раствором хлоргексидина 2 раза в сутки, затем наносить мазь левомеколь или бетадин.  
особое внимание уделять зонам плохого заживления ( область паха и подмышки).
- 2) защитить линию швов от разлизывания ( ношение защитного воротника)
- 3) швы снимать на 10-12 сутки с момента операции.
- 4) Контролировать область кожи на поясице ( место прилегания отрицательного электрода для электрокоагулятора во время операции), в случае признаков воспаления в этой области - незамедлительный осмотр в клинике.  
по результатам гистологического исследования новообразования - принятие решения о последующих действиях.

#### Внутри:

- 1) Петкам 0,5 по 1 таблетке 1 раз в день 3 дней.
- 2) Омез 20 мг, по 1/4 капсуле 2 раза в день за 30 минут до приема пищи.
- 3) Габапентин по 1/2 капсулы 2 раза в день , курс 2 дня.

#### Внутривенно:

Цефтриаксон 1 г , разбавить натрием - хлорида 10 мл , из готового раствора набрать 3.3 мл - довести натрием хлорида до 10 мл.Вводить в течении 5 - 8 мин , 2 раза в день , курс 5 дней.

Тщательный мониторинг общего состояния: аппетит, жажда, стул, мочеиспускание, температура тела ( в норме 37.5 - 39.5 )

Если до утра не будет стула , задать ректально клизма микролакс.

При ухудшении состояния обратиться в клинику раньше.

Повторный осмотр хирурга через 3 дня.

#### ЧЕК:

№	Номенклатура	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	Стационар интенсивной терапии кошки, собаки, экзоты 5- 10 кг ДЕНЬ(препараты и процедуры) 2К	1	День	1 800,00	1 800,00
2	Микролакс (микроклизма) 5 мл	1	шт	190,00	190,00
3	Габапентин (Нейронтин) 300мг (капсулы) №50	2	капс	56,00	112,00
<b>ВСЕГО ПО ЧЕКУ:</b>					<b>2 102,00</b>