

21.03.2026, 14:59

Мия, Дронова Екатерина Геннадьевна, ЕВРОВЕТ Тюмень Проезд Заречный, 35/1

ЕВРОВЕТ Тюмень Проезд Заречный, 35/1

Адрес клиники: Тюмень, Тюмень, Проезд Заречный, 35/1
Телефон клиники: 8-800-551-09-82

ФИО владельца: Дронова Екатерина Геннадьевна
Лечащий ветеринарный врач: Лебедева Диана
Валерьевна

Кличка: Мия
Вид/порода: Кошка / Бенгальская
Пол: Н, возраст: 3 г. 4 м.
Вес: 3.80

Выписка из медицинской карты животного

Дата обращения: 20.03.2026 14:33

Описание лечения:

ДЕТАЛИЗИРОВАННОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ САМКИ

Наличие свободной жидкости в брюшной полости: не визуализируется.

Лимфатические узлы брюшной полости: не изменены.

Мочевой пузырь: визуализируется. Расположение: типичное. Форма овоидная. Размер: умеренно наполнен. Содержимое: анэхогенное, однородное. Стенка однородная; не утолщена, до 0.09 см. Новообразования и конкременты не визуализируются.

Уретра: проксимальный отдел уретры не расширен, стенки не утолщены.

Матка и яичники: культы без особенностей (ОГЭ).

Почки:

Левая почка: визуализируется. Не увеличена, 2.85 x 1.77 см. Форма овальная. Контуры ровные. Расположение типичное. Капсула дифференцируется. КМД сохранена. Кортикальный слой однородный, эхогенность сохранена. Мозговой слой однородный, эхогенность сохранена. Лоханка не изменена. Мочеточник не визуализируется, не расширен. Сосудистый рисунок (ЦДК) выражен умеренно. Новообразований и конкрементов не визуализируется.

Правая почка: визуализируется. Не увеличена, 2.99 x 1.80 см. Форма овальная. Контуры ровные. Расположение типичное. Капсула дифференцируется. КМД сохранена. Кортикальный слой однородный, эхогенность сохранена. Мозговой слой однородный, эхогенность сохранена. Лоханка не изменена. Мочеточник не визуализируется, не расширен. Сосудистый рисунок (ЦДК) выражен умеренно. Новообразований и конкрементов не визуализируется.

Надпочечники:

Левый надпочечник: визуализируется. Размер каудального полюса 0,31 см. Форма типичная. Контуры ровные. Границы четкие. Эхогенность сохранена. Эхоструктура однородная. КМД сохранена.

Правый надпочечник: визуализируется. Размер каудального полюса 0,33 см. Форма типичная. Контуры ровные. Границы четкие. Эхогенность сохранена. Эхоструктура однородная. КМД сохранена.

Печень: визуализируется. Расположение: типичное. Размер: увеличена. Контуры ровные, четкие. Свободный край притуплен. Эхоструктура паренхимы неоднородная, микронодулярная. Эхогенность понижена. Сосудистый рисунок печени умеренно выражен.

Желчный пузырь: визуализируется. Умеренно наполнен. Контуры ровные. Форма пузыря типичная. Содержимое: анэхогенное, неоднородное по типу билиарного сладжа незначительно. Стенка однородная, не утолщена, до 0,09 см. Общий желчный проток не расширен.

Поджелудочная железа (ПЖЖ): визуализируется. Не увеличена. Правая доля до 0.88 см. Левая доля: до 0.75 см. Эхогенность понижена. Эхоструктура однородная. Проток не расширен. Жировая ткань не изменена.

21.03.2026, 14:59

Мия, Дронова Екатерина Геннадьевна, ЕВРОВЕТ Тюмень Проезд Заречный, 35/1

3.2026, 14:57

ЕВРОВЕТ Тюмень
Адрес клиники:

Селезенка: визуализируется. Размер: не увеличена, до 0.90 см. Контур ровный. Эхоструктура неоднородная, микронодулярная. Эхогенность сохранена. Сосудистый рисунок выражен умеренно.

Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ):

Желудок: перистальтика снижена, неэффективная. Толщина стенки до 0.20 см. Дифференциация слоев стенки выражена. Соотношение слоев стенки желудка изменено: преобладает подслизистый слой. Содержимое: кормовые массы значительно (голод 4ч; со слов владелицы кормили влажным кормом без кусочков, по исследованию визуализируется скопление именно кормовых масс с плотными кусочками).

12-перстная кишка (ДПК): перистальтика снижена. Толщина стенки до 0.24-0.26 см. Дифференциация слоев стенки выражена. Соотношение слоев стенки кишки изменено: преобладают мышечный, подслизистый и слизистый слои. Содержимое: гиперэхогенное однородное содержимое умеренно (химус).

Тощая кишка: перистальтика снижена. Толщина стенки до 0.19-0.20 см. Дифференциация слоев стенки выражена. Соотношение слоев стенки кишки изменено: преобладают мышечный, подслизистый и слизистый слои. Содержимое: гиперэхогенное однородное содержимое умеренно (химус).

Подвздошная кишка: перистальтика снижена. Толщина стенки до 0.16-0.18 см. Дифференциация слоев стенки выражена. Соотношение слоев стенки кишки изменено: преобладают мышечный и подслизистый слои. Содержимое: гиперэхогенное однородное содержимое незначительно (химус).

Слепая кишка: толщина стенки до 0.27 см. Дифференциация слоев стенки выражена. Соотношение слоев стенки кишки изменено: преобладает подслизистый слой.

Ободочная кишка: перистальтика не визуализируется. Толщина стенки до 0.15-0.17 см. Дифференциация слоев стенки выражена. Соотношение слоев стенки кишки изменено: выражен мышечный слой. Просвет расширен оформленными массами умеренно.

Заключение: на момент исследования УЗ-признаки:

- гепатомегалии; диффузных изменений паренхимы печени, характерных для нодулярной гиперплазии/регенерации, нельзя исключить холангиогепатит/холангит;
- холецистита (регистрируются следы сладжа в просвете желчного пузыря, что у кошек всегда является патологией);
- диффузных изменений паренхимы ПЖЖ, характерных для подострого состояния;
- диффузных изменений паренхимы селезенки, характерных для нодулярной гиперплазии, нельзя исключить сплениит/экстрамедуллярный гемопоэз/иное;
- снижения эвакуаторно-моторной функции желудка, нельзя исключить гастрит, динамическую\механическую непроходимость - **рекомендуется УЗ-контроль через 6 часов на голод;**
- хрон энтеропатии\ВЗК\иного.

Данное заключение не является диагнозом и должно быть клинически интерпретировано лечащим врачом.

Ветеринарный врач: Лебедева (Евхут) Д.В.

Ветеринарный врач: Лебедева Диана Валерьевна