



Ветеринарная клиника "ДРУГ"

г. Новосибирск ул. Выборная 144/1 (круглосуточно), ул. Лескова 15 (09-21) ул. Сиб-Гвард 60/1 (круглосуточно) ул. Русская 11/1 (09-21) ул.
Энгельса 12 (круглосуточно) ул. Лесосечная 16 (09-21) ул. Новогодняя 24/3 ул. Фадеева 66/5 г. Бердск, ул. Красная Сибирь 103 (круглосуточно)
г. Искитим, ул. Советская 220 (круглосуточно)

Договор №

Ф.И.О. Владельца: Вовк Михаил Юрьевич

Питомец: Молли

Вид животного: Кошки, Возраст: 7 л. 2 м. 2 н., Пол: С

Порода: Метис

Вес: **3.80**

Диагноз: (Вероятные) Овариореминантный синдром, (Вероятные) Культит матки, (Окончательные) послеоперационный период

Рекомендации и назначения:

Послеоперационная памятка для владельца животного

После операции в течение суток разрешено находиться только на полу. На диване, кресле, кровати и т.д. только под присмотром владельцев.

- Кормить и поить можно, при условии что животное уже способно самостоятельно принимать пищу.
- В течение суток после операции может наблюдаться рвота.
- В области шва может быть припухлость, это норма. Есть вероятность формирования серомы (контролируемое осложнение, сопровождающееся скоплением жидкости между слоями тканей) в связи с этим, если же отек сильно выражен через 5-7 дней или увеличиваться в размерах, необходимо обратиться к врачу для аспирации содержимого сформировавшейся полости.
- Во избежание разлизывания операционной раны, ношение защитной послеоперационной попону (10-14 дней).
- Синуксол 50 мг по 1.5 т 2 раза в день 7 дней (с 14.12 вечера)
- Вемелкам 0.5 мг по 1 т 1 раз в день после кормления (с 15.12 утра) *4 дня*
- Обработка швов с третьего дня водным раствором хлоргексидина 0.05% (1-2 раза в день до снятия швов)
- ОСМОТР швов на 5-7 день по записи
- Снятие швов на 10-12 день после операции, по предварительной записи
- В течение 2-х недель после операции рекомендовано отслеживать частоту дыхательных движений (ЧДД) в состоянии покоя (вдох/выдох принимается за 1 единицу) Измерение проводить во время сна животного, количество дыхательных движений не должно превышать 24 ед. за минуту. При повышении (ЧДД) необходимо обратиться за консультацией к врачу.
- Придерживаться рационов для кастрированных животных (РоялКанин, Хиллс, Проплан и тп.)

Наблюдать за животным, при ухудшении состояния или появлении новых симптомов незамедлительно обратиться к ветеринарному врачу.

Ветеринарный врач: Андропова Ирина Васильевна

Владелец: Вовк Михаил Юрьевич

Подпись _____



Подпись _____