



Пациент: Кошка Фрося, Мейн-кун. № ЭМК: 4419
Пол: Самка (стерилизована)
Возраст: 10 лет
Вес: кг.
Владелец: Белова Людмила Александровна, Москва, ул. Ск. Мухиной, д. 12, кв. 181, тел.: +7(903)622-72-03, e-mail: mila298@mail.ru

УЗИ брюшной полости от 29.03.2022

Жидкость: анэхогенная
Количество: незначительное

Печень

Размеры: не увеличена
Эхоструктура: однородная
Очаговые образования: не визуализируются
Границы: четкие
Эхогенность: нормальная

Желчный пузырь

Степень наполнения: наполненный
Содержимое: анэхогенное
Очаговые образования: не визуализируются
Стенка: утолщена (до 1.2 мм, эхогенность повышенна)

Селезенка

Расположение: не изменено
Размеры: не увеличена
Эхогенность: нормальная
Очаговые образования: не визуализируются

Почки

Левая

Визуализация: четкая
Топография: нормальная
Размеры: 4,3 см. (структура коркового слоя слабо диффузно неоднородная)
Эхогенность коркового слоя: нормальная
Корково-мозговая дифференциация: сохранена
Лоханка: не изменена

Правая

Визуализация: четкая
Топография: нормальная
Размеры: 4,6 см. (структура коркового слоя слабо диффузно неоднородная)
Контуры: ровные
Эхогенность коркового слоя: нормальная

Корково-мозговая дифференциация: сохранена
Лоханка: не изменена

Мочевой пузырь

Степень наполнения: наполненный
Содержимое: анэхогенное
Стенка: не утолщена

Желудочно-кишечный тракт

Описание: Желудок: наполнение - слабое; содержимое -газ, видимые стенки не утолщены; слоистость стенок сохранена; складки стенки сохранены;
Пилорический сфинктер: без видимых изменений.
Тонкий кишечник: просвет -спавшийся, стенки не утолщены - 2.4 мм; слоистость стенок - выражен подслизистый и мышечный слои; перистальтика сохранена
Подвздошно-ободочный сфинктер: без видимых изменений
Ободочная кишка: стенки не утолщены
Поджелудочная железа: левая доля - 8.9 мм , эхогенность без видимых изменений, структура слабо диффузно неоднородная, единичный гипоэхогенный, округлый очаг размером 3.9 мм

Лимфатические узлы

Описание: без видимых изменений

Другие органы

Заключение: Затеки свободной жидкости в брюшной полости.
Признаки холецистита.
Подозрение на хроническую энтеропатию.
Диффузно - очаговые изменения поджелудочной железы; можно подозревать хронический панкреатит, нодулярную гиперплазию.
Слабо выраженные диффузные изменения паренхимы почек, нельзя исключать хроническую нефропатию.

Врач: Болюх Валерия Николаевна
№ записи: 3893 от 29 марта 2022 г.